For the use of a veterinarian or a Hospital or a Laboratory or a Farm.

Amitraz Dip Concentrate Liquid I P

Taktic®

12.5% E C

For External Use only

NOT FOR HUMAN USE - FOR ANIMAL TREATMENT ONLY

NOT FOR USE IN AQUACULTURE

Composition :

Each ml Contains :

Amitraz I P ..... 125 mg

Solvent & Emulsifiers q.s.

Preparation :

Taktic® is a highly effective ectoparasiticide constituting the unique active ingredient Amitraz. Its exceptional acaricidal and insecticidal activity against a broad spectrum of ticks, mange mites, lice and ked has been demonstrated in extensive field trials and commercial use throughout the world. It is effective in all the life cycle stages of ectoparasites and also in those species resistant to organochlorine, organophosphate, carbamate and synthetic pyrethroid compounds. Since it does not accumulate in animal tissues and has very low mammalian toxicity, it is extremely safe for animals as well as the human beings.

Indications :

For prevention and control of ectoparasitic infections like Ticks, Mange mites, lice as well as ked in Cattle, Camel, Sheep, Goats and Pigs. Taktic® kills ticks, mange mites and lice including strains resistant to organochlorines, organophosphates and synthetic pyrethroids.

Administration and Dosage :

Taktic® to be used as spray or dip treatment

	Spray		Dipping	
Animal	Taktic® 12.5%	Litres of water	Initial fill or Dip Volume	Recharge (When Initial Dip Volume Reduced by 20%)
Cattle	10 ml	5	1 Lt. Taktic® in 500 Lts. of Water	1.5 Lts. Taktic® in 500 Lts. of Water
Camel	10 ml	5	–	–
Sheep/ Goat	20 ml	5	1 Lt. Taktic® in 250 Lts. of Water	1.5 Lts. Taktic® in 250 Lts. of Water
Pigs	20 ml	5	–	–

DIRECTIONS FOR USE

Cattle, Camel

Spraying

Hand Spraying - Use 20 ml in 10 litres of water. Prepare spray on the day of treatment, using clean water. Spray the whole body of the animal until it is thoroughly wet.

Spray Race- Initial fill : 1 litre Taktic® in 500 litres of water. Where run-off is re-circulated, reinforced by adding 150-200 ml Taktic® to the sum for every 100 heads of cattle treated, but DO NOT add more water. Continue treating until no more spray can be pumped out. If spraying is to continue, recharge at the initial concentration.

Spray Wash Retention- It is essential to stabilise unused spray wash by adding lime (80% minimum calcium hydroxide) at 2 kg per 200 litres wash and stirring well. Where the race will not be used for an extended period, discard the spray. Note : In severe cases of mange or lice infestation a second treatment is recommended 7-10 days after the first.

Dipping

Initial fill : 1 litre Taktic® in 500 liters of water. Recharge : When the dip volume has fallen by 20% of the initial fill, recharge with 1.5 litres Taktic® in 500 litres of water. Fill with clean water. Add the required volume of Taktic® and stir well. The dip can be retained for later use.

Dip wash Retention
If the dip wash is to be retained for later use, it is essential to stabilise the active ingredient in the wash as follows :
*Charge the dip with Taktic®as above, and add10 grams of commercial grade hydrated lime containing a minimum of 80% calcium hydroxide for every 1.5 litres of dip solution.
*Recharge as necessary with Taktic® also adding 10 grams of lime with every 1.5 liters of Dip solution.

Sheep and Goats - Treatment with Taktic® will control ticks, mange mites, lice and keds.

Spraying - Use 40 ml Taktic® in 10 litres of water. Prepare spray on the day of treatment, using clean water. Spray the whole body of the animal until it is thoroughly wet.

Dipping - Dipping is the recommended method for the treatment of sheep. Initial fill : 1 litre Taktic®in 250 litres of water. Recharge : When the dip volume has fallen by 20% of the initial fill, recharge with 1.5 litres Taktic®in 250 litres of water. Prepare the dip on the day of use. Fill with clean water. Add the required volume of Taktic®and stir well. Retain the animal in the dip for approximately 30 seconds, immersing the head at least once. Do not dip tired or thirsty animals. Discard dip after use. Treat all animals in a flock whether visibly affected or not.

Pigs - Treatment with Taktic®will control mange and lice at the same time. Use 40 ml Taktic in 10 litres of water. Prepare spray on the day of treatment, using clean water. Treat all animals in a group at the same time, whether visibly affected or not. Remove feed from pens and cover drinking bowls. Remove bedding and clean out pens. Use sufficient spray to soak animals thoroughly, paying particular attention to the ears, the groin and between forelegs.

Contraindications and Warnings : Keep Out of Reach of Children.
This product is not recommended for use on Horse, Cat & Chihuahua breed of dog.

Safety - Taktic® may be used on Cattle, Camel, Sheep, Goats and Pigs of all ages and at any stage of pregnancy.

Precautions : For use only under a Veterinary Surgeons instructions. HARMFUL IF SWALLOWED. IRRITATING TO EYES AND SKIN. WEAR OVERALLS, RUBBER GLOVES AND FACE SHIELD when working with the concentrate. WEAR ARM-LENGTH RUBBER GLOVES, RUBBER BOOTS AND BIG APRON when handling the diluted liquid or recently treated animals. WASH ANY CONCENTRATE OR DILUTED PRODUCT from the skin or eyes immediately. AVOID WORKING IN SPRAY MIST. AVOID ALL CONTACT BY MOUTH. REMOVE HEAVILY CONTAMINATED CLOTHING IMMEDIATELY. WASH GLOVES THOROUGHLY after use, especially the insides. Wash hands and exposed skin before eating, drinking and smoking and after work. IF YOU FEEL SICK, seek medical advice (Show label if possible).

Guide to Doctor- Amitraz is not an organophosphorus compound. If poisoning is suspected, treatment should be symptomatic and supportive, paying particular attention to monitoring of respiratory and cardiac functions. However, recovery is normally spontaneous. Do NOT use Atropine. Do NOT induce vomiting. Medical management is gentle gastric lavage followed by symptomatic and supportive treatment. Emesis is contraindicated because of the risk of entry of solvent content into the lungs.

Protection of Environment :
Taktic®is harmful to fish. Do not allow material to enter watercourses or contaminate ponds, waterways and ditches with licensed product formulation or used container.

Storage : Store in original container tightly closed in a safe place away from foodstuffs. Store protected from light

Withdrawal Period : Meat - 1 day for Cattle & Goats and 7 days for Pigs & Sheep
Milk - 4 milkings / 2 dyas

PROTECT FROM FROST - DO NOT USE ON HORSE

Presentation - 6 ml, 15 ml Aluminium Bottle, 50 ml & 250 ml Tin Container.

® Registered Trademark

Prescription product consult your Veterinarian.

PD2910091 8 100 x 150 mm

Marketed by :
Intervet India Pvt. Ltd.
6th Floor, Tower 5, World Trade Center, Survey No 1,
Kharadi, Pune – 411014, Maharashtra, India
Ph. No. +91 20 66294700/01;
Email Id – infoin-india@merck.com; www.msd-animal-health.co.in

MSD
Animal Health

IN-TKT-210800002

केवल पशु चिकित्सक या अस्पताल या प्रयोगशाला या फार्म के उपयोग के लिए

अमित्राज़ डिप कॉन्सन्ट्रेट लिक्विड आई पी

टैक्टिक®

12.5% ई सी

केवल बाहरी उपयोग के लिए

मानव उपयोग के लिए नहीं – केवल पशु उपचार के लिए

मत्स्य पालन में उपयोग के लिए नहीं

घटक:

प्रति मिली में है:

अमित्राज़ आई पी	125 मिग्रा
सोल्वेंट एवं एम्यूलसिफायर्स	क्यू. एस.

तैयारी:

टैक्टिक® एक अत्यधिक प्रभावी बाह्य परजीवीनाशक है जो अद्वितीय सक्रिय संघटक अमित्राज़ से बनाया जाता है. किलनी, घुन, जूँ और केडो के व्यापक स्पेक्ट्रम के खिलाफ इसकी असाधारण प्राणघातक और कीटनाशी गतिविधि को दुनिया भर में व्यापक क्षेत्र परीक्षणों और व्यावसायिक उपयोग में प्रदर्शित किया गया है. यह बाह्य परजीवी के सभी जीवन चक्र चरणों में और ऑर्गेनोक्लोरिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्बामेट और सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड्स यौगिकों के लिए प्रतिरोधी प्रजातियों में भी प्रभावी है. क्योंकि यह जानवरों के ऊतकों में जमा नहीं होता है और इससे स्तनधारी जानवरों में बहुत कम विषाक्तता होती है, इसलिए यह जानवरों के साथ-साथ मनुष्यों के लिए भी बेहद सुरक्षित है.

निर्देश:

गाय, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअरों में किलनी, घुन, जूँ के साथ-साथ केडो जैसे बाह्यपरजीवी संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए. टैक्टिक®, यह ऑर्गेनोक्लोरिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस और सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड्स के प्रतिरोधी उपभेदों सहित किलनी, घुन और जूँ को मार देता है.

दिया जाना और खुराक:

टैक्टिक® का इस्तेमाल स्प्रे या डिप ट्रीटमेंट के रूप में किया जाना चाहिए.

	स्प्रे		डिपिंग	
पशु	टैक्टिक® 12.5%	पानी लिटर में	शुरूआती फिल या डिप मात्रा	रीचार्ज (जब शुरूआती डिप की मात्रा 20% से कम हो जाए)
गाय	10 मिली	5	500 लीटर पानी में 1 लीटर टैक्टिक®	500 लीटर पानी में 1.5 लीटर टैक्टिक®
ऊंट	10 मिली	5	–	–
भेड़/बकरी	20 मिली	5	250 लीटर पानी में 1 लीटर टैक्टिक®	250 लीटर पानी में 1.5 लीटर टैक्टिक®
सूअर	20 मिली	5	–	–

इस्तेमाल के लिए निर्देश

गाय, ऊंट

स्प्रेइंग

हैंड स्प्रेइंग – 10 लीटर पानी में 20 मिली का इस्तेमाल करें. उपचार वाले दिन स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करते हुए स्प्रे तैयार करें. पशु के पूरे शरीर पर तब तक स्प्रे करें जब तक वह पूरी तरह से गीला न हो जाए.

स्प्रे रेस – शुरूआती फिल : 500 लीटर पानी में 1 लीटर टैक्टिक®. जहां बह जाने वाली पानी को फिर से बनाना हो वहां 150-200 मिली टैक्टिक® प्रति 100 पशुओं के अनुसार मिलाकर इसकी शक्ति बढ़ाएं, लेकिन उसमें और पानी न मिलाएं. जब तक और स्प्रे नहीं किया जा सकता हो तब तक लगातार स्प्रे करते रहें. यदि स्प्रे करते रहना हो तो इसे शुरूआती मात्रा के साथ फिर से बनाएं.

स्प्रे वॉश रिटेंशन – प्रति 200 लीटर वॉश में 2 किलो लाइम (कम से कम 80% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड) मिलाकर और इसे अच्छी तरह से हिलाकर इस्तेमाल न किए गए स्प्रे वॉश को स्थिर करना जरूरी होता है. जहां रेस को आगे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वहां स्प्रे को नष्ट कर दें. नोट: घुन या जूँ के गंभीर संक्रमण के मामले में, पहले उपचार के 7-10 दिनों बाद दूसरे उपचार की सिफारिश की जाती है.

डिपिंग:

शुरूआती फिल: 500 लीटर पानी में 1 लीटर टैक्टिक®. रीचार्ज: जब डिप की मात्रा शुरूआती फिल के 20% जितना कम हो जाती है तब 500 लीटर पानी में 1.5 लीटर टैक्टिक® के साथ रीचार्ज करें. साफ पानी से भरें. टैक्टिक® की आवश्यक मात्रा मिलाएं और अच्छी तरह से हिलाएं. डिप को बाद में इस्तेमाल के लिए बचाए रखा जा सकता है.

डिप वॉश रिटेंशन: यदि डिप वॉश को बाद में इस्तेमाल के लिए बचाए रखना है तो डिप वॉश के सक्रिय घटकों को निम्नलिखित अनुसार स्थिर करना जरूरी है:

*डिप को टैक्टिक® के साथ ऊपर बताए अनुसार तैयार करें, और हर 1.5 लीटर के डिप घोल में कम से कम 80% कैल्शियम हाइड्रोक्साइट युक्त 10 ग्राम कमर्शियल ग्रेड हाइडेटेड लाइम (चुना) मिलाएं.

*आवश्यकतानुसार टैक्टिक® से रीचार्ज करें, साथ ही हर 1.5 लीटर के डिप घोल में 10 ग्राम लाइम मिलाएं.

भेड़ और बकरियां: टैक्टिक® के साथ उपचार किलनी, घुन, जूँ और केडो को नियंत्रित करेगा.

स्प्रेइंग: 10 लीटर पानी में 40 मिली टैक्टिक® का इस्तेमाल करें. उपचार वाले दिन, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करते हुए स्प्रे तैयार करें. जब तक पूरी तरह से गीला न हो जाए तब तक जानवर के पूरे शरीर पर स्प्रे करें.

डिपिंग: डिपिंग विधि की सिफारिश भेड़ के उपचार के लिए की जाती है. शुरूआती फिल: 250 लीटर पानी में 1 लीटर टैक्टिक®. रीचार्ज: जब डिप की मात्रा शुरूआती फिल के 20% जितनी कम हो जाती है तो 250 लीटर पानी में 1.5 लीटर टैक्टिक® के साथ इसे रीचार्ज करें. इस्तेमाल करने के दिन डिप तैयार करें. साफ पानी से भरें. टैक्टिक® की आवश्यक मात्रा मिलाएं और अच्छी तरह से हिलाएं. लगभग 30 सेकंड तक पशु को डिप में रहने दें, कम से कम एक बार सिर को डुबोएं. थके हुए या प्यासे पशुओं को न डुबोएं. इस्तेमाल के बाद डिप को नष्ट कर दें. सभी जानवरों का झुंड में इलाज करें चाहें पशु प्रभावित दिखाई देता हो या न दिखाई देता हो.

सूअर: टैक्टिक® के साथ उपचार घुन और जूँ को एक ही समय पर नियंत्रित करेगा. 10 लीटर पानी में 40 मिली टैक्टिक® का इस्तेमाल करें. उपचार वाले दिन, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करते हुए स्प्रे तैयार करें. सभी पशुओं का झुंड में एक ही समय पर इलाज करें, चाहें पशु प्रभावित दिखाई देता हो या न दिखाई देता हो. बाड़े से चारा निकालें और पानी पीने के बर्तनों को ढक दें. बिछौना को हटा दें और बाड़े को साफ कर लें. पशु पूरी तरह से सोख लें इसलिए पर्याप्त स्प्रे का इस्तेमाल करें, खासतौर से कानों, श्रोणि और आगे की टांगों पर ध्यान दें.

विपरीत संकेत और सावधानियां: बच्चों की पहुंच से दूर रखें. यह उत्पाद घोड़ों, बिल्ली और कुत्तों की चिहुआहुआ नस्ल के लिए नहीं सुझाई जाती है.

सुरक्षा: टैक्टिक® का इस्तेमाल सभी उम्र की गाय, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअरों पर और गर्भावस्था की किसी भी अवस्था में किया जा सकता है.

ऐहतियात: केवल पशु चिकित्सक के निर्देशों के तहत इस्तेमाल किया जाए. निगलने पर हानिकारक है. आँख और त्वचा में जलन होती है. इस सार पदार्थ के साथ काम करते समय, पूरे रबड़ के दस्ताने और फेस शील्ड पहनें. मिश्रित तरल पदार्थ या हाल ही में उपचारित जानवर को संभालते समय बांह की लंबाई तक का रबड़ ग्लव्स, रबड़ बूट और बड़ा-सा एप्रोन पहनें. सार पदार्थ या मिश्रित उत्पाद को त्वचा और आँखों से तुरंत साफ करें. स्प्रे के धुएं में काम करने से बचें. मुंह के बिल्कुल संपर्क में न आने दें. बहुत ज्यादा दूषित कपड़ों को तुरंत निकालें. इस्तेमाल के बाद दस्तानों को अच्छी तरह से धोएं, खासतौर से अंदरूनी तौर पर. खाने, पीने और धूम्रपान करने से पहले और काम करने के बाद, हाथों और संपर्क में आई त्वचा को धोएं. यदि आप बीमार महसूस करते हैं तो चिकित्सा सलाह लें (यदि संभव हो तो उत्पाद पर लगा लेबल दिखाएं).

डॉक्टर के लिए मार्गदर्शन: अमित्राज़ कोई ऑर्गेनोफॉस्फोरस घटक नहीं है. यदि विषाक्तता का संदेह हो तो उपचार लक्षणों के अनुसार और सहायक होना चाहिए, खासतौर से श्वसन और हृदय संबंधी कार्यप्रणाली की निगरानी करके ध्यान दिया जाना चाहिए. हालांकि, स्वास्थ्य-लाभ अपने आप होता है. एट्रोपाइन का इस्तेमाल न करें. उल्टी करने के लिए न उकसाएं. चिकित्सा प्रबंधन के लिए सौम्य गैस्ट्रिक लैवेज की सलाह दी जाती है, उसके बाद लक्षणों के अनुसार और सहायक उपचार किया जाता है. फेफड़ों में घुलनशील घटकों के प्रवेश कर जाने के कारण एमेसिस का इस्तेमाल न किए जाने की सलाह दी जाती है.

पर्यावरण की सुरक्षा:
टैक्टिक® मछली के लिए हानिकारक है. पानी के स्रोतों में इसकी सामग्री को न जाने दें या तालाब, जलमार्गों और नालियों को लाइसेंस वाले उत्पाद के फॉर्म्युलेशन या इस्तेमाल किए गए कंटेनर से दूषित न करें.

भंडारण: खाने की चीजों से दूर एक सुरक्षित जगह पर कस कर बंद करके मूल कंटेनर में भंडारित करें.

परहेज अवधि: मांस – गाय और बकरी के लिए 1 दिन और सूअर और भेड़ के लिए 7 दिन
दूध – 4 बार दूध दुहना/2 दिन

प्रकाश से सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें

नमी से बचाएं – घोड़ों पर इस्तेमाल न करें

प्रदर्शन: 6 मिली, 15 मिली एल्युमिनियम बोतल, 50 मिली और 250 मिली का टिन कंटेनर.

PD2910091 8 100 x 150 mm

®रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क
डॉक्टर से लिखवाकर उत्पाद लेने के लिए, अपने पशु चिकित्सक से परामर्श करें.

Marketed by :
Intervet India Pvt. Ltd.
6th Floor, Tower 5, World Trade Center, Survey No 1,
Kharadi, Pune – 411014, Maharashtra, India
Ph. No. +91 20 66294700/01;
Email Id – infoin-india@merck.com; www.msd-animal-health.co.in

MSD
Animal Health

IN-TKT-210800002

पशुवैद्यकीय किंवा रुग्णालय किंवा प्रयोगशाळा किंवा शेती च्या वापरासाठीच

अमित्रझ डिप कॉन्सेन्ट्रेट लिक्विड आयपी

टॅक्टिक®

12.5% ईसी

फक्त बाह्य वापरासाठी

हे मानवी वापरासाठी नाही – केवळ पशु उपचारांसाठी आहे

मासेमारीच्या वापरासाठी नाही

घटक:

प्रति मिलीलीटर मध्ये आहे:

अमित्राझ आयपी ..... 125 मिग्रॅ

सॉल्व्हेंट्स आणि इमल्सीफायर्स क्वांटिटि सफिशिएंट

तयार करण्यासाठी:

टॅक्टिक® एक अत्यंत प्रभावी बाह्य परजीवीनाशक आहे त्यामध्ये अद्वितीय सक्रिय घटक अमित्राझपासून बनलेला आहे. गोचीड, मेंज माइट्स, उवा आणि कीटकांच्या विस्तृत श्रेणी विरूद्ध त्याची अपवादात्मक प्राणघातक आणि कीटकनाशक क्रियाकलाप जगभरातील विस्तृत क्षेत्रीय चाचण्या आणि व्यावसायिक वापरामध्ये दर्शविली गेली आहे. बाह्य परजीवीच्या सर्व जीवनचक्राच्या टप्प्यांमध्ये आणि ऑर्गनोक्लोरीन, ऑर्गनोफॉस्फरस, कार्बामेट आणि सिंथेटिक पायरेथ्रॉईड संयुगे प्रतिरोधक प्रजातींमध्ये हे प्रभावी आहे. कारण ते प्राण्यांच्या पेशींमध्ये साठले जात नाही आणि सस्तन प्राण्यांसाठी खूप कमी विषकारक आहे, हे प्राण्यांसाठी तसेच मानवांसाठी अत्यंत सुरक्षित आहे.

सूचना:

गाय, उंट, मेंढी, शेळ्या आणि डुकरांमधील बाह्यपरजीवी हे गोचीड, मेंज माइट्स, उवा यासारख्या अतिरिक्त परजीवी उपद्रव प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहे. टॅक्टिक®, हे गोचीड, मेंज माइट्स आणि उवांना मारते, ज्यात ऑर्गनोक्लोरीन, ऑर्गनोफॉस्फरस आणि सिंथेटिक पायरेथ्रॉईड्सना प्रतिरोधक करणाऱ्यां परजीवींचा समावेश आहे.

प्रशासन आणि डोस:

टॅक्टिक® चा वापर स्प्रे किंवा डिप ट्रीटमेंट म्हणून केला पाहिजे.

प्राणी	स्प्रे		डिपींग	
	टॅक्टिक® 12.5%	वॉटर लिटर्समध्ये	इनिशियल फिल किंवा डिप व्हॉल्यूम	रिचार्ज (जेव्हा डिप व्हॉल्यूम 20% च्या खाली असेल)
गाई	10 मिली	5	500 लीटर पाण्यात 1 लीटर टॅक्टिक®	500 लीटर पाण्यात 1.5 लीटर टॅक्टिक®
उंट	10 मिली	5	–	–
मेंढी/बकरी	20 मिली	5	250 लीटर पाण्यात 1 लीटर टॅक्टिक®	250 लीटर पाण्यात 1.5 लीटर टॅक्टिक®
डुकर	20 मिली	5	–	–

वापरासाठी सूचना

गाय, उंट

फवारणी

हाताने फवारणी – 10 लिटर पाण्यात 20 मिली चा वापर करा. उपचाराच्या दिवशी स्वच्छ पाणी वापरून स्प्रे तयार करा. प्राण्यांच्या शरीरावर संपूर्ण ओले होईपर्यंत फवारणी करा.

स्प्रे रेस – भरण्यास सुरूवात करणे: 500 लिटर पाण्यात 1 लिटर टॅक्टिक®. 150–200 मिली टॅक्टिक® टाकून वाहणारे पाणी पुन्हा निर्माण करणे आवश्यक आहे तेथे प्रमाण वाढवा, परंतु जास्त पाणी घालू नका. आणखी फवारणी करता येत नाही तोपर्यंत सतत फवारणी करत रहा. जर तुम्हाला फवारणी चालू ठेवायची असेल तर सुरुवातीच्या प्रमाणात ते पुन्हा तयार करा.

स्प्रे वॉश रिटेंशन – न वापरलेले स्प्रे वॉश प्रति 200 लिटर वॉशमध्ये प्रति 2 किलो चुणा घालून चांगले हलवून स्थिर करणे आवश्यक आहे. जेथे रेस पुढे वापरली जाणार नाही तेथे स्प्रे नष्ट करा. टीप: गंभीर प्रमाणात माइट किंवा उवांचा प्रादुर्भाव झाल्यास, पहिल्या उपचारानंतर 7–10 दिवसांनी दुसरा उपचार करण्याची शिफारस केली जाते.

डिपींग:

सुरुवातीला भरण्यासाठी: 500 लिटर पाण्यात 1 लिटर टॅक्टिक®. रिचार्ज: जेव्हा बुडण्याचे प्रमाण सुरुवातीच्या भरण्याच्या 20% पर्यंत कमी होते, तेव्हा 500 लिटर पाण्यात 1.5 लिटर टॅक्टिक® सह रिचार्ज करा. स्वच्छ पाण्याने भरा. आवश्यक प्रमाणात टॅक्टिक® त्यामध्ये टाका आणि चांगले हलवा. हे डिप नंतरच्या वापरासाठी साठवले जाऊ शकते.

डिप वॉश रिटेन्शन:
जर डिप वॉश नंतरच्या वापरासाठी जतन करायचे असेल तर डिप वॉशचे सक्रिय घटक खालीलप्रमाणे स्थिर करणे आवश्यक आहे:
*टॅक्टिक® सह वर वर्णन केल्यानुसार डिप तयार करा आणि प्रत्येक 1.5 लीटर डिपच्या द्रावणात कमीतकमी 80% कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड असलेले 10 ग्रॅम व्यावसायिक ग्रेड हायड्रेटेड चुना त्यामध्ये घाला.
*आवश्यकतेनुसार टॅक्टिक® सह रिचार्ज करा, प्रत्येक 1.5 लिटर डिप सोल्यूशनमध्ये 10 ग्रॅम चुना घाला.

मेंढी आणि शेळ्या: टॅक्टिक® सह उपचार गोचीड, मेंज माइट्स, उवा आणि माइट्स यांस नियंत्रित करतील.

फवारणी: 10 लिटर पाण्यात 40 मिली टॅक्टिक® वापरा. उपचाराच्या दिवशी स्वच्छ पाण्याचा वापर करून स्प्रे तयार करा. प्राण्यांच्या शरीरावर संपूर्ण ओले होईपर्यंत फवारणी करा.

डिपींग: मेंढीच्या उपचारासाठी डिपींगच्या पद्धतीची शिफारस केली जाते. सुरुवातीला भरण्यासाठी: 250 लिटर पाण्यात 1 लिटर टॅक्टिक®. रिचार्ज: जेव्हा डिपींगचे प्रमाण सुरुवातीच्या डिपींगच्या 20% पर्यंत कमी होते, तेव्हा ते 250 लिटर पाण्यात 1.5 लिटर टॅक्टिक® सह रिचार्ज करा. वापराच्या दिवशी डिपींग तयार करा. स्वच्छ पाण्याने भरा. आवश्यक प्रमाणात टॅक्टिक® त्यामध्ये टाका आणि चांगले हलवा. कमीतकमी एकदा डोके बुडवून प्राण्याला अंदाजे 30 सेकंद बुबकीत राहू द्या. थकलेले किंवा तहानलेले प्राणी त्यामध्ये बुडवू नका. वापरानंतर डिपींग नष्ट करा. जनावर प्रभावित झाले असतील किंवा नसतील तरीही कळपामधील सर्व प्राण्यांवर उपचार करा.

डुकर: टॅक्टिक® सह उपचारांमुळे एकाच वेळी गोचीड आणि उवा नियंत्रणात येतील. 10 लिटर पाण्यात 40 मिली टॅक्टिक® वापरा. उपचाराच्या दिवशी स्वच्छ पाण्याचा वापर करून स्प्रे तयार करा. कळपामधील सर्व प्राण्यांवर एकाच वेळी उपचार करा, जनावर प्रभावित झाले असतील किंवा नसतील तरीही कळपामधील सर्व प्राण्यांवर उपचार करा. चारा बंदीतून काढून टाका आणि पाण्याची भांडी झाकून ठेवा. बेड काढा आणि बंदिस्त स्वच्छ करा. पुरेशा प्रमाणात स्प्रे वापरा जेणेकरून प्राणी पूर्णपणे शोषले जाईल, विशेषत: त्यांचे कान, ओटीपोट आणि पुढच्या पायांकडे लक्ष द्या.

विरोधाभास आणि खबरदारी: मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवा.
हे उत्पादन घोडे, मांजरी आणि कुत्र्यांच्या चिहुआहुआ जातींसाठी शिफारस केलेले नाही.

सुरक्षा: टॅक्टिक® हे गायी, उंट, मेंढी, शेळ्या आणि डुकरांवर सर्व वयोगटातील आणि गर्भधारणेच्या कोणत्याही टप्प्यांमध्ये वापरली जाऊ शकते.

खबरदारी: फक्त पशुवैद्यकाच्या निर्देशानुसारच यांचा वापर करावा. गिळल्यास हानिकारक आहे. डोळे आणि त्वचेवर जळजळ होऊ शकते. या द्रावणासह सह काम करताना, पूर्ण रबराचे हातमोजे आणि एक फेस शील्ड घाला. मिश्रित द्रावण किंवा अलीकडे उपचार केलेले प्राणी हाताळताना हाताच्या लांबीचे रबरचे हातमोजे, रबरी बूट आणि मोठे ॲप्रन घाला. त्वचा आणि डोळ्यांमधून द्रावण किंवा मिश्रित उत्पादन त्वरित काढून टाका. स्प्रे फ्यूमनमध्ये काम करणे टाळा. तोंडाच्या संपर्कात अजिबात येऊ देऊ नका. खूप प्रमाणातील दूषित कपडे त्वरित काढून टाका. वापरल्यानंतर हातमोजे पूर्णपणे धुवा, विशेषत: घराच्या आत. खाणे, मद्यपान आणि धूम्रपान करण्यापूर्वी आणि नंतर हात आणि उघड त्वचा धुवा. तुम्हाला आजारी वाटत असल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या (शक्य असल्यास, उत्पादनाचे लेबल दाखवा)

डॉक्टरांचे मार्गदर्शन: अमित्राझ हा ऑर्गनोफॉस्फरस घटक आहे. विषबाधा झाल्याचा संशय असल्यास, उपचार लक्षणात्मक आणि आश्वासक असले पाहिजेत, विशेषतः श्वसन आणि हृदयाच्या कार्यावर लक्ष ठेवण्यास प्राधान्य दिले जावे. तथापि, रिकव्हरी हि स्वाभाविक च आहे. एट्रोपिन चा वापर करू नका नका. उलट्या करण्यास प्रवृत्त करू नका. वैद्यकीय व्यवस्थापनासाठी, सौम्य गॅस्ट्रिक लॅवेजची शिफारस केली जाते, त्यानंतर लक्षणात्मक आणि सहाय्यक उपचाराची शिफारस केली जाते. फुफ्फुसांमध्ये विद्रव्य घटकांच्या प्रवेशामुळे एमेसिसचा वापर न करण्याचा सल्ला दिला जातो.

पर्यावरणाचे संरक्षण: टॅक्टिक® हे माशांसाठी हानिकारक आहे. त्याची सामग्री पाण्याच्या स्त्रोतांमध्ये जाऊ देऊ नका किंवा परवानाकृत उत्पादन किंवा वापरलेल्या कंटेनरच्या निर्मितीसह तलाव, जलमार्ग आणि नाले दूषित करू नका.

साठवण: अन्नपदार्थांपासून दूर एका सुरक्षित ठिकाणी मूळ कंटेनरमध्ये घट्ट बंद ठेवा.

प्रकाशापासून संरक्षित ठिकाणी साठवणूक करा

विथड्रॉवल पिरियड: मांस–गाय आणि बकरीसाठी 1 दिवस आणि डुकर आणि मेंढीसाठी 7 दिवस
दूध–4 वेळीचे दुध/2 दिवस

ओलाव्यापासून संरक्षण करा – घोड्यांवर वापरू नका

प्रदर्शन: 6 मिली, 15 मिली ॲल्युमिनियम बाटली, 50 मिली आणि 250 मिली टिन कंटेनर.

®नोंदणीकृत ट्रेडमार्क
प्रिस्क्रिप्शन उत्पादनासाठी, तुमच्या पशुवैद्याचा सल्ला घ्या.

PD2910091 8 100 x 150 mm

Marketed by :
Intervet India Pvt. Ltd.
6th Floor, Tower 5, World Trade Center, Survey No 1,
Kharadi, Pune – 411014, Maharashtra, India
Ph. No. +91 20 66294700/01;
Email Id – infoin-india@merck.com; www.msd-animal-health.co.in

MSD
Animal Health

IN-TKT-210800002

ಪಶುವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ.

ಅಮಿಟ್ರಾಜ್ ಡಿಪ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ದ್ರವ IP

ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®

12.5% EC

ಬಾಹ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

ಅಮಿಟ್ರಾಜ್ I P 125mg

ದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ಗಳು ಕ್ಯೂ. ರು.

ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ- ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಜಲಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ

ತಯಾರಿ:

ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಕ್ಟೋಪರಾಸಿಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾದ ಅಮಿಟ್ರಾಜ್. ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕರಿಸೈಡಲ್ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಉಣ್ಣಿ ಹೇನು, ನೊಣ, ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೆಡೆ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಟೋಪರಾಸೈಟ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೊಕ್ಲೋರಿನ್, ಆರ್ಗನೊಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿ ವಿಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆಗಳು:

ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ಸೋಂಕುಗಳಾದ ಉಣ್ಣಿ ಹೇನು, ನೊಣ, ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು, ಒಂಟೆ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಡೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್® ಉಣ್ಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಆರ್ಗನೊಕ್ಲೋರಿನ್ಗಳು, ಆರ್ಗನೊಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳು.

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಡೋಸೇಜ್:

ಸ್ಟೇ ಅಥವಾ ಅದ್ದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಗಳು

ಪ್ರಾಣಿ	ಸ್ಟೇ		ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ	
	ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® 12.5%	ಲೀಟರ್ ನೀರು	ಆರಂಭಿಕ ಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್	ರೀಚಾರ್ಜ್ (ಆರಂಭಿಕ ಡಿಪ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 20%ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ)
ಜಾನುವಾರು	10 ಮಿಲಿ	5	1ಲೀ ಟಾಕ್ಟಿಕ® 500 ಲೀ. ನೀರಿನಿಂದ	1.5 ಲೀ. 500 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®
ಒಂಟೆ	10 ಮಿಲಿ	5	–	–
ಕುರಿ/ಮೇಕೆ	20 ಮಿಲಿ	5	1ಲೀ ಟಾಕ್ಟಿಕ® 250 ಲೀ. ನೀರಿನಿಂದ	1.5 ಲೀ. 250 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®
ಹಂದಿಗಳು	20 ಮಿಲಿ	5	–	–

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು

ದನ, ಒಂಟೆ

ಸಿಂಪಡಿಸುವ

ಕೈ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ –10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ. ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಸ್ಟೇ ತಯಾರಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೇವವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಸ್ಟೇ ರೇಸ್– ಆರಂಭಿಕ ಭರ್ತಿ: 500 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®. ಅಲ್ಲಿರನ್–ಆಫ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ 100 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು 150–200 ಮಿಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವವರೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಟೇ ವಾಶ್ ಧಾರಣ – ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸ್ಟೇ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಸುಣ್ಣವನ್ನು (80% ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್) 200 ಲೀಟರ್ ವಾಶ್‌ಗೆ 2 ಕೆಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೂಚನೆ: ಮಂಜೆ ಅಥವಾ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳ ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 7–10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಳುಗಿಸುವುದು

ಆರಂಭಿಕ ಭರ್ತಿ: 500 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®. ರೀಚಾರ್ಜ್: ಡಿಪ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಭರ್ತಿಯ 20% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, 500 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1.5 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅದ್ದಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅದ್ದುತೊಳೆಯುವ ಧಾರಣ:
ನಂತರದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಡಿಪ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ವಾಶ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ:

*ಮೇಲಿನಂತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಪ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 1.5 ಲೀಟರ್ ಡಿಪ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 80% ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ 10 ಗ್ರಾಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

*ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®ನೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ಯಮೆರಿವಂತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ 1.5 ಲೀಟರ್ ಡಿಪ್ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು – ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®ನೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಉಣ್ಣಿ, ಹುಳಗಳು, ಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ

ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು – 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 40 ಮಿಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® ಬಳಸಿ. ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೇವವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಮುಳುಗಿಸುವುದು – ಕುರಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಭರ್ತಿ: 250 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಡಿಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®. ಮರುಬಳಕೆ: ಆರಂಭಿಕ ಭರ್ತಿಯ 20% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಾಗ, 250 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1.5 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ®ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಕೆಯ ದಿನದಂದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಆಗ್ಯಮೆರಿವವ ಪರಿಮಾಣದ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ, ತಲೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮುಳುಗಿಸಿ. ದಣಿದ ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬೇಡಿ. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಂದಿಗಳು – ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® ಜೊತೆಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಡಪು ಮತ್ತು ಪರೋಪಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 40 ಮಿಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® ಬಳಸಿ. ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ತಯಾರಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಗೋಚರವಾಗುವಂತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಹಾಸಿಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ, ಕಿವಿ, ತೊಡೆಸಂದು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.

ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕುದುರೆ, ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಯಿಯ ಚಿಹ್ನೋವಾ ತಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಸುರಕ್ಷಿತ – ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® ಅನ್ನು ಜಾನುವಾರು, ಒಂಟೆ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಸೂಚನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು. ನುಂಗಿದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲುಡುಪುಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ತೆಳುವಾದ ದ್ರವ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತೋಳಿನ ಉದ್ದದ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನೆಲಗಟ್ಟನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತುಂತುರು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಭಾರೀ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಳು. ತಿನ್ನುವ, ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ (ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಲೇಬಲ್ ತೋರಿಸಿ).

ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ – ಅಮಿಟ್ರಾಜ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೊಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಂಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ವಿಷದ ಅನುಮಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಉಸಿರಾಟದ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಟ್ರೊಪಿನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ವಾತಾಶಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೆಜ್ ನಂತರ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ದ್ರಾವಕ ಅಂಶವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಪಾಯದಿಂದಾಗಿ ವಾಂತಿ ವಿರುದ್ಧಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ – ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ® ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೊಳಗಳು, ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಂಟೇನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಿ.

ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಧಿ:
ಮಾಂಸ – ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ 1 ದಿನ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಿಗೆ 7 ದಿನಗಳು
ಹಾಲು – 4 ಹೊತ್ತಿನ ಹಾಲು/ 2 ದಿನಗಳು

ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.

ಹಿಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ - ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಡಿ

ಪ್ರಸ್ತುತಿ – 6 ಮಿಲಿ, 15 ಮಿಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಟಲ್, 50 ಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು 250 ಎಂಎಲ್ ಟಿನ್ ಕಂಟೇನರ್.

PD2910091B 100 x 150 mm

®ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್
ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Marketed by :
Intervet India Pvt. Ltd.
6th Floor, Tower 5, World Trade Center, Survey No 1,
Kharadi, Pune – 411014, Maharashtra, India
Ph. No. +91 20 66294700/01;
Email Id – infoin-india@merck.com; www.msd-animal-health.co.in

MSD
Animal Health

IN-TKT-210800002

ஒரு கால்நடை மருத்துவர் அல்லது மருத்துவமனை அல்லது ஆய்வகம் அல்லது பண்ணை பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்

அமிட்ராஸ் டிப் செறிவு திரவம் ஐபி

டாக்டிக்®

12.5% இ சி

வெளிப்புற பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்

சேர்மானம்:
ஒவ்வொரு மிலி-ன் உள்ளடக்கம்:
அமித்ராஸ் ஐபி ..... 125 மிகி
சால்வன்ட் மற்றும் எமல்சிஃபயர்ஸ் னு.ண்.

மனித பயன்பாட்டுக்கு அல்ல - விலங்கு சிகிச்சைக்கு மட்டும்

மீன்பண்ணையில் பயன்படுத்தக் கூடாது

தயாரிப்பு:
விலங்குகளில் வெளிஒட்டுண்ணிகளை ஒழிப்பதில் ஒரு உயர் செயலாற்றல் கொண்ட டாக்டிக் மருந்தில் பிரத்யேக செயலாற்றும் பொருளாக அமிட்ராஸ் அடங்கியுள்ளது. தெள்ளுப்பூச்சிகள், சொறி சிற்றுண்ணிகள், பேன் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகளை ஒழிப்பதில் ஒரு பரந்த மற்றும் வீரியமான செயல்பாடு கொண்டது மற்றும் இது விரிவான களப்பரிசோதனைகள் மற்றும் உலகம் முழுவதும் வணிகப் பயன்பாடு மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது வெளிஒட்டுண்ணிகளின் வாழ்க்கை சுழற்சி நிலைகள் அனைத்திலும் செயலாற்றலுடன் வேலை செய்கிறது மற்றும் ஆர்கனோக்ளோரின், ஆர்கனோபாஸ்பேட், கார்பமேட் மற்றும் சிந்தடிக் பைரெத்ராய்ட் காம்பவுண்ட்களுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்ட பூச்சியினங்களுக்கு எதிராகவும் செயலாற்றல் கொண்டது. இது விலங்கு திசுக்களில் சேராது மற்றும் பாலூட்டிகளில் மிக குறைந்த நச்சுத்தன்மை கொண்டதாக உள்ளது என்பதால், விலங்குகளுக்கும் அதே போல் மனிதர்களுக்கும் அதீத பாதுகாப்பானது.

அறிகுறிகள்:
தெள்ளுப்பூச்சிகள், சொறி சிற்றுண்ணிகள், பேன் போன் வெளிஒட்டுண்ணி தொற்றுகள் அதே போல் மாடுகள், ஒட்டகம், செம்மறியாடு, வெள்ளாடுகள் மற்றும் பன்றிகளில் ஒட்டுண்ணிகளை தடுக்க மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு. ஆர்கனோகுளோரின், ஆர்கனோபாஸ்பேட்ஸ் மற்றும் சிந்தடிக் பைரெத்ராய்ட்களுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்ட ஸ்டெரயின்கள் உள்பட தெள்ளுப்பூச்சிகள், சொறி ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் பேன்களை டாக்டிக் கொல்கிறது.

பயன்படுத்துதல் மற்றும் மருந்தளவு:
டாக்டிக்கை தெளிப்பு அல்லது அமிழ் சிகிச்சையாக பயன்படுத்த வேண்டும்

விலங்கு	தெளிப்பு		அமிழ்த்தல்	
	டாக்டிக்® 12.5%	தண்ணீர் விட்டரில்	ஆரம்ப நிரப்புதல் அல்லது அமிழ் அளவு	ரீசார்ஜ் (ஆரம்ப அமிழ் அளவு 20% சதவீதம் குறைந்து விட்டால்)
மாடு	10 மிலி	5	500 லி. தண்ணீரில் லி. டாக்டிக்®	500 லி. தண்ணீரில் 1.5 லி. டாக்டிக்
ஒட்டகம்	10 மிலி	5	-	-
செம்மறியாடு/வெள்ளாடு	20 மிலி	5	250 லி. தண்ணீரில் 1 லி. டாக்டிக்	250 லி. தண்ணீரில் 1.5 லி. டாக்டிக்®
பன்றிகள்	20 மிலி	5	-	-

பயன்படுத்தும் குறிப்புகள்
மாடு, ஒட்டகம்
தெளித்தல்
கையால் தெளித்தல் - 20 லிட்டர் தண்ணீரில் 20 மிலி பயன்படுத்தவும். சிகிச்சை அளிக்கும் நாளில் சுத்தமான தண்ணீரை பயன்படுத்தி தெளிப்புக் கரைசலை தயாரிக்கவும். விலங்கின் உடல் முழுவதும் நன்றாக நனையும் வரை தெளிக்கவும்.

தெளிப்பு ரேஸ் - ஆரம்ப நிரப்புதல்: 100 லிட்டர் தண்ணீரில் 1 லிட்டர் டாக்டிக். வழிந்தோடும் தண்ணீர் மீள்-சுழற்சியாக்கப்பட்டால், சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு 100 விலங்குகளுக்கும் 150-200 மிலி டாக்டிக் சேர்த்து வீரியம் கூட்டவும், ஆனால் அதிக தண்ணீர் சேர்க்கக் கூடாது. இனியும் தெளிக்க முடியாது என்ற நிலை வரும் வரை சிகிச்சையை தொடரவும். தொடர்ந்து தெளிக்க வேண்டியதிருந்தால், ஆரம்ப செறிவில் ரீசார்ஜ் செய்யவும்.

ஸ்பிரே வாஷ் ரிடென்ஷன் - பயன்படுத்தாத ஸ்பிரே வாஷை 200 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிகி என சுண்ணாம்பு (குறைந்தது 80% கால்சியம் ஹைட்ராக்ஸைட்) சேர்த்து மற்றும் நன்கு கலக்குவதன் மூலம் நிலைப்படுத்துவது அத்தியாவசியமானது. ஒரு நீட்டிக்கப்பட்ட காலத்துக்கு ரேஸ் பயன்படுத்தப்படாது என்றால், ஸ்பிரேயை தூர கொட்டவும். குறிப்பு: சொறி ஒட்டுண்ணி அல்லது பேன் தொற்று கடுமையாக உள்ள விலங்குகளுக்கு முதல் சிகிச்சைக்கு பிறகு 7-10 நாட்களில் இரண்டாவது சிகிச்சை அளிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

டிப்பிங்
ஆரம்ப நிரப்புதல்: 500 லிட்டர் தண்ணீரில் ஒரு லிட்டர் டாக்டிக். ரீசார்ஜ்: அமிழ் அளவு ஆரம்ப நிரப்புதலில் இருந்து 20% குறைந்து விட்டால், 500 லிட்டர் தண்ணீரில் 1.5 லிட்டர் டாக்டிக் கலந்து ரீசார்ஜ் செய்யவும். சுத்தமான தண்ணீரால் நிரப்பவும். தேவையான அளவு டாக்டிக் சேர்க்கவும் மற்றும் நன்கு கலக்கவும். இந்த கலவையை பிறகு பயன்படுத்த தக்க வைக்க முடியும்.

டிப் வாஷ் தக்க வைத்தல்
டிப் வாஷ் பிற்பாடு பயனுக்கு தக்க வைக்கப்பட வேண்டியதிருந்தால், வாஷில் உள்ள செயலாற்றும் உட்பொருளை பின்வருமாறு நிலைப்படுத்துவது அத்தியாவசியமானது:
*மேலே கூறியப்படி டிப்பை சார்ஜ் செய்யவும், மற்றும் ஒவ்வொரு 1.5 லிட்டர் டிப் கரைசலுக்கும் குறைந்தது 80% கால்சியம் ஹைட்ராக்ஸைட் அடங்கிய வணிகரீதியிலான தரநிலை ஹைட்ரேட்டர் சுண்ணாம்பு 10 கிராம் சேர்க்கவும்.
*தேவைப்படி டாக்டிக்® உடன் ரீசார்ஜ் செய்யவும், மேலும் ஒவ்வொரு 1.5 லிட்டர் டிப் கரைசலுக்கு 10 கிராம் சுண்ணாம்பு சேர்க்கவும்.

செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடுகள் : டாக்டிக்® உடன் சிகிச்சை அளிப்பது தெள்ளுப்பூச்சிகள், சொறி ஒட்டுண்ணிகள், பேன் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகளை கட்டுப்படுத்துகிறது.

தெளித்தல் : 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 40 மிலி டாக்டிக் பயன்படுத்தவும். சிகிச்சை நாளன்று சுத்தமான தண்ணீர் பயன்படுத்தி தெளிப்பு கரைசலை தயாரிக்கவும். விலங்கு முழுமையாக நனையும் வரை அதன் உடல் முழுவதும் நன்றாக தெளிக்கவும்.

டிப்பிங் – செம்மறியாடுகளுக்கு சிகிச்சையாக டிப்பிங் முறையே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆரம்ப நிரப்புதல்: 250 லிட்டர் தண்ணீரில் 1 லிட்டர் டாக்டிக். ரீசார்ஜ்: ஆரம்ப நிரப்பல் அளவில் இருந்து டிக் அளவு 20% குறைந்து விட்டால், 250 லிட்டர் தண்ணீரில் 1.5 லிட்டர் டாக்டிக் கலந்து ரீசார்ச் செய்யவும். பயன்படுத்தும் நாளன்று டிப் தயாரிக்கவும். சுத்தமான தண்ணீரால் நிரப்பவும். தேவையான அளவு டாக்டிக் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். குட்டையில் விலங்கை தோராயமாக 30 விநாடிகளுக்கு நிற்க வைக்கவும், தலையை குறைந்தது ஒரு தடவையாவது அமிழ்த்த வேண்டும். களைப்பாக அல்லது தாகமாக இருக்கும் விலங்குகளை அமிழ்த்தக் கூடாது. பயன்படுத்தியப் பிறகு டிப்பை தூர கொட்டவும். ஒரு மந்தையில் உள்ள எல்லா விலங்குகளுக்கும், அவற்றில் பாதிப்பு கண்ணுக்கு தெரிந்தாலும் அல்லது தெரியாவிட்டாலும் சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பன்றிகள் – டாக்டி உடன் சிகிச்சை அளிப்பது ஒரே நேரத்தில் சொறி ஒட்டுண்ணி மற்றும் பேன்களை கட்டுப்படுத்தும். 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 40 மிலி டாக்டிக் பயன்படுத்தவும். சிகிச்சை நாளன்று சுத்தமான தண்ணீரை பயன்படுத்தி தெளிப்பை தயாரிக்கவும். ஒரு மந்தையில் உள்ள அனைத்து விலங்குகளுக்கும், பாதிப்பு கண்ணுக்கு தெரிந்தாலும் அல்லது தெரியாவிட்டாலும் பொருட்படுத்தாது ஒரே சமயத்தில் சிகிச்சை அளிக்கவும். கொட்டைகைளில் உள்ள தீவனத்தை அகற்றவும் மற்றும் நீர் குடிக்கும் கோப்பைகளை மூடி வைக்கவும். கூளங்களை அகற்றவும் மற்றும் கொட்டகையை சுத்தப்படுத்தவும். விலங்குகளை முழுமையாக ஊற வைக்க போதிய கரைசலை பயன்படுத்தவும், குறிப்பாக காதுகள், இடை மற்றும் முன்னங்கால்களுக்கு இடையே கவனம் செலுத்தவும்.

கொடுக்கப்படக்கூடாது மற்றும் எச்சரிக்கைகள் : குழந்தைகளுக்கு கிடைக்காத இடத்தில் வைக்கவும்.
இந்தப் பொருளை குதிரை, பூனை மற்றும் சிஹுவா நாய் இனத்துக்கு பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

பாதுகாப்பு – அனைத்து வயதில் உள்ள மாடுகள், ஒட்டகம், செம்மறியாடு, வெள்ளாடுகள் மற்றும் பன்றிகளுக்கு கர்ப்பக்காலத்தில் எந்தவொரு கட்டத்திலும் டாக்டிக்® பயன்படுத்த முடியும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள் : ஒரு கால்நடை அறுவை சிகிச்சை மருத்துவரின் அறிவுறுத்தல்களின் கீழ் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். விழுங்கி விட்டால் தீங்கானது. கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் எரிச்சல் உண்டு பண்ணும். செறிவு உடன் வேலை செய்கையில் உடலை முழுசாக மறைக்கும் ஆடைகள், ரப்பர் கையுறைகள் மற்றும் முகத்தடுப்பு பயன்படுத்தவும். வீரியம் குறைக்கப்பட்ட நிரவத்தை அல்லது சமீபத்தில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட விலங்குகளை கையாளும் போது கை-நீள ரப்பர் உறைகள், ரப்பர் பூட்ஸ் மற்றும் பெரிய மேலங்கி அணியவும். சருமம் அல்லது கண்களில் ஏதாவது செறிவு அல்லது நீர்த்தப் பொருள் இருந்தால் உடனடியாக கழுவி விடவும். தெளிப்பு தூவானத்தில் வேலை செய்வதை தவிர்க்கவும். வாயில் எதுவும் படாமல் தவிர்க்கவும். அதிகமாக மாசுபட்ட ஆடைகளை உடனடியாக கழற்றி விடவும். பயன்படுத்திய பிறகு உறைகளை, குறிப்பாக உட்புறங்களில் நன்றாக கழுவவும். சாப்பிடும், குடிக்கும் மற்றும் புகைப்பதற்கு முன்பு மற்றும் வேலைக்கு பிறகு கைகள் மற்றும் சருமத்தில் பட்ட இடங்களில் நன்றாக கழுவவும். நீங்கள் சுகக்கேடாக உணர்ந்தால், உடனே மருத்துவ ஆலோசனை பெறவும் (காத்தியமெனில் லேபிளை காட்டவும்).

மருத்துவருக்கு வழிகாட்டுதல் – அமிட்ராஸ் ஒரு ஆர்கனோபாஸ்பரம் காம்புவுண்ட் அல்ல. விஷமேறியதாக சந்தேகிக்கப்பட்டால், சிகிச்சை அறிகுறிக்கேற்பவும் மற்றும் ஆதரவாகவும் இருக்க வேண்டும், குறிப்பாக சுவாச மற்றும் இதய செயல்பாடுகளை கண்காணிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எனினும், நலம் பெறுவது வழக்கமாக தாளாகவே நடக்கிறது. அட்ரோபின் பயன்படுத்தக் கூடாது. வாந்தி எடுக்க தூண்டக் கூடாது. மருத்துவ மேலாண்மையாக இரைப்பையை இதமாக கழுவுதலும் அதனை தொடர்ந்து அதனை தொடர்ந்து அறிகுறிக்கேற்ப மற்றும் ஆதரவு சிகிச்சையாகவும் இருக்கும். எமிசிஸ் கொடுக்கப்படக் கூடாது ஏனென்றால் கரைசலில் இருப்பது நுரையீரல்களுக்குள் நுழையும் அபாயம் உள்ளது.

சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல்:
டாக்டிக்® மீன்களுக்கு தீங்கானது. இப்பொருள் நீர்வழித்தடங்களில் உள்நுழைய அல்லது குளங்கள், நீர்நிலைகள் மற்றும் குட்டைகளை உரிமம் பெற்றப் பொருள் ஃபார்முலேஷன் அல்லது பயன்படுத்திய கன்டெய்னர் மாசுபடுத்த அனுமதிக்காதீர்கள்.

சேமிப்பு: அசல் டப்பாவில் இறுக்கமாக மூடி உணவுப்பொருட்களில் இருந்து தள்ளி ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் சேமிக்கவும். வெப்பத்தில் இருந்து பாதுகாக்கவும்.

விலகும் காலம்: இறைச்சி மாடுகள் மற்றும் வெள்ளாடுகளுக்கு 1 நாள்; பன்றிகள் மற்றும் செம்மறியாடுகளுக்கு 7 நாட்கள்
பால் - 4 கறவைகள் / 2 நாட்கள்

உறைபனியில் இருந்து பாதுகாக்கவும் - குதிரைக்கு பயன்படுத்தக் கூடாது

வழங்கல் – 6 மிலி, 15 மிலி அலுமினியம் பாட்டிலில், 50 மிலி மற்றும் 250 மிலி டின் கன்டெய்னரில்

® பதிவுப்பெற்ற டிரேட்மார்க்
பரிந்துரைப் பொருளுக்கு உங்கள் கால்நடை மருத்துவருடன் ஆலோசிக்கவும்.

PD2910091 8 100 x 150 mm

Marketed by :
Intervet India Pvt. Ltd.
6th Floor, Tower 5, World Trade Center, Survey No 1,
Kharadi, Pune – 411014, Maharashtra, India
Ph. No. +91 20 66294700/01;
Email Id – infoin-india@merck.com; www.msd-animal-health.co.in

MSD
Animal Health

IN-TKT-210800002

కేవలం పశువైద్యుల లేదా ఆసుపత్రి లేదా ప్రయోగశాల లేదా పొలాల ఉపయోగంకోసం

అమిత్రాజ్ డిప్ కాన్సంట్రేట్ లిక్విడ్ ఐపి

టాక్టిక్®

12.5% ఇసి

బయట ఉపయోగించుటకు మాత్రమే

మనుషుల ఉపయోగం కోసం కాదు – జంతువుల చికిత్స కోసం మాత్రమే

జలవ్యవసాయంలో ఉపయోగం కోసం కాదు

కూర్పు:

ప్రతి మి.లీ లో

అమిత్రాజ్ ఐపి..... 125 మి గ్రా

ద్రావకం మరియు ఎమెల్సీఫైర్స్ క్యూ యస్

తయారీ:

టాక్టిక్® బాహ్య పరాన్నజీవులపై ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది, ఇది అమిత్రాజ్ అనే ప్రత్యేకమైన క్రియాశీలక పదార్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దాని అసాధారణమైన క్రిమిసంహారకం మరియు క్రిములను చంపే పనితీరు వివిధ రకాల పేలు, పురుగులు, పేను మరియు కెడ్స్ కు వ్యతిరేకంగా ఉందని విస్తరణ పాలాల పరీక్షలో మరియు వాణిజ్య ఉపయోగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రదర్శించబడింది. బాహ్య పరాన్నజీవుల యొక్క అన్ని దశలలో మరియు ఆర్గానోక్లోరైన్, ఆర్గానోఫాస్ఫే ట్, కార్బమేట్, సింతటిక్ పైరిత్రాయిడ్ నిరోధక జాతులలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. జంతువుల కణజాలాలలో పేరుకుపోదు కాబట్టి సకస్త జంతుజాతి పై తక్కువ విష లక్షణం కలిగి ఉంటుంది. ఇది జంతువులకు మరియు మనుషులకు సురక్షితమైనది.

సూచనలు:

పురుగులు మరియు ఈగలు, పశువులు, గేదెలు, గొర్రెలు, మేకలు, ఒంటెలు, గుర్రాలు, కుక్కలు & పందులు వంటి బాహ్య పరాన్నజీవుల ఇన్ఫెక్షన్ల నివారణ మరియు నియంత్రణ కోసం. టాక్టిక్® పేలు, పురుగులు, పేను ఇంకా ఆర్గానోక్లోరైన్, ఆర్గానోఫాస్ఫే ట్, కార్బమేట్, సింతటిక్ పైరిత్రాయిడ్ నిరోధక జాతులను చంపుతుంది.

పరిపాలన మరియు మోతాదు:

టాక్టిక్® స్ప్రే లేదా డిప్ ట్రీట్‌మెంట్‌గా ఉపయోగించాలి

జంతువులు	స్ప్రే		డిప్పింగ్	
	టాక్టిక్® 12.5%	లీటర్ నీటిలో	ప్రారంభ ఫిల్ లేదా డిప్ పరిమాణం	రీఛార్జ్ (ఎప్పుడైతే ప్రారంభ డిప్ పరిమాణం 20% తగ్గితే)
పశువులు	10 మి.లీ	5	1 లీ టాక్టిక్® ను 500 లీ నీటి తో	1.5 లీ టాక్టిక్® ను 500 లీ నీటి తో
ఒంటె	10 మి.లీ	5	–	–
గొర్రె / మేక	20 మి.లీ	5	1 లీ టాక్టిక్® ను 250 లీ నీటి తో	1.5 లీ టాక్టిక్® ను 250 లీ నీటి తో
పందులు	20 మి.లీ	5	–	–

వినియోగించుటకు సూచనలు

పశువులు, ఒంటె

స్ప్రేయింగ్

చేతి తో స్ప్రేయింగ్ – 20 లీటర్ల నీటిలో 20 మి.లీ వాడండి. స్ప్రే ని మంచి నీటితో చికిత్స చేసే రోజే సిద్ధం చేయండి. పశువు యొక్క శరీరం పూర్తిగా తడిసేల స్ప్రే చేయండి.

స్ప్రే రేస్ – ప్రారంభ ఫిల్ ద్రావణం: 1 లీటర్ టాక్టిక్® ను 500 లీటర్ల నీటి తో కలపండి. రన్–ఆఫ్ పునర్వినియోగించేటప్పుడు, 100–200 మిలీ టాక్టిక్® ను ప్రతి 100 పశువులకు కలపండి, అలా అని ఎక్కువ నీటిని కలపకండి. స్ప్రే అయ్యేంతవరకు చికిత్స చేస్తూ ఉండండి. స్ప్రే కొనసాగించాలంటే ప్రారంభ పరిమాణంలో రీఛార్జ్ చేయండి

స్ప్రే నిల్వపుంచు – ఉపయోగించని స్ప్రే స్థిరపర్చడానికి 200 లీటర్ స్ప్రే లో 2 కెజి సున్నాన్ని కలపండి. పాడిగించిన కాలవధిలో రేస్ ని ఉపయోగించనట్లైతే స్ప్రే ని తొలగించండి. గమనిక: పురుగుల లేదా పేను యొక్క తీవ్రమైన గుంపుల సందర్భాలలో మొదటి చికిత్స తర్వాత 7–10 రోజులకు రెండవ చికిత్స సిఫార్సు చేయబడింది.

డిప్పింగ్–

ప్రారంభ ఫిల్: 1 లీటర్ టాక్టిక్® ను 500 లీటర్స్ నీటితో. రీఛార్జ్ : ద్రావణం యొక్క లోతు మొదట్లో ఉన్న లోతు కంటే 20% తగ్గినప్పుడు 1.5 లీటర్స్ టాక్టిక్® ను 500 లీటర్స్ మంచి నీటి తో కలపండి. అవసరమైన పరిమాణం లో టాక్టిక్® ను కలపండి. ఈ ద్రావణాన్ని మళ్ళీ ఉపయోగించవచ్చు.

ద్రవణం నిల్వవుంచు
ఒకవేళ ద్రవణాన్ని తర్వాత ఉపయోగించాలనుకుంటే, అందులో ఉన్న క్రియాశీల పదార్థంని స్థిరపర్చడానికి ఇలా చేయండి:
* ద్రవణాన్ని పై విధముగా ఛార్జ్ చేయండి మరియు ప్రతీ 1.5 లీటర్స్ ద్రవణానికి కనీసం 80% కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ని కలిగిఉన్న 10 గ్రా కమర్షియల్ గ్రేడ్ హైడ్రేటెడ్ సున్నం కలపాలి.
* అవసరమైన టాక్టిక్® ను నింపండి దాంతోపాటూ ప్రతీ 1.5 లీటర్స్ ద్రవణానిలో 10 గ్రా సున్నాన్ని కలపండి.

గొర్రెలు మరియు మేకలు – టాక్టిక్® చికిత్స పేలు, పురుగులు, పేను మరియు కెడ్స్ ను నియంత్రిస్తుంది

స్ప్రే – 40 మిలీ టాక్టిక్® ను 10 లీటర్స్ నీటితో కలపండి. స్ప్రే ని మంచి నీటితో చికిత్స చేసే రోజే సిద్ధం చేయండి. పశువు యొక్క శరీరం పూర్తిగా తడిసేల స్ప్రే చేయండి.

గొర్రెల చికిత్సకు డిప్పింగ్ సిఫార్సు చేయబడింది. 1 లీటర్ టాక్టిక్® లో 250 లీటర్స్ నీటిని కలపండి. ద్రవణం యొక్క పరిమాణం ప్రారంభ లో ఉన్న పరిమాణం కంటే 20% తగ్గితే 1.5 లీటర్స్ టాక్టిక్® మరియు 250 లీటర్స్ నీటిని నింపండి. ద్రవణాన్ని ఉపయోగించరోజే మంచి నీటితో నింపండి అవసరమైన పరిమాణంలో టాక్టిక్® ను నింపి బాగా కలపండి. పశువులను 30 సెకన్లు వరకు ద్రవణం లో ఉంచి కనీసం ఒక్కసారైనా తలని ముంచండి. అలసలగా లేదా దాహంగా ఉన్న పశువులను ముంచవద్దు. పశువులను ఉపయోగించిన తర్వాత ద్రవణాన్ని వదిలేయండి. మందలో ఉన్న అన్ని జంతువులను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేసినా లేకపోయినా చికిత్స చేయండి.

పందులు – టాక్టిక్® చికిత్స పేను మరియు పురుగుల పై ఒకేసారి నియంత్రిస్తుంది. 40 మి లీ టాక్టిక్® ను 10 లీటర్స్ నీటితో కలపండి. స్ప్రేని మంచి నీటితో చికిత్స చేసే రోజే సిద్ధం చేయండి. మందలో ఉన్న అన్ని పశువులకు ఒకేసారి చికిత్స చేయండి. పందులు ఉండే కట్టడం నుంచి అవి తినే ఆహార పదార్థాలను తొలగించి, త్రాగే గిన్నెలపై ఏమన్నా కప్పండి. పక్క బట్టలు తొలగించి, పందుల దొడ్డిని శుభ్రం చేయండి. జంతువులు పూర్తిగా మునగడానికి తగినంత స్ప్రేని ఉపయోగించండి, చెవులు, మెల భాగము మరియు ముందర కాళ్ళ మధ్య ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి.

వ్యతిరేక సూచనలు మరియు హెచ్చరికలు: పిల్లలకు దూరంగా ఉండేలా జాగ్రత్త పహించండి.
ఈ ఉత్పత్తి గుర్రం, పిల్లి మరియు కుక్క యొక్క చివావా జాతికి ఉపయోగించడానికి సిఫార్సు చేయబడలేదు

భద్రత – టాక్టిక్® పశువులు, ఒంటెలు, గొర్రెలు, మేకలు మరియు పందులపై అన్ని వయసుల వారికి మరియు గర్భం యొక్క ఏ దశలోనైనా టాక్టిక్®ను ఉపయోగించవచ్చు

ముందుజాగ్రత్తలు: పశువైద్యుల సూచనల మేరకు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. మింగితే హానికరం. కళ్ళు మరియు చర్మానికి చిరాకు కలిగిస్తుంది. ద్రవణం తయారుచేసేటప్పుడు ఓవర్‌ఆల్స్, రబ్బరు గ్లోవ్స్ మరియు ఫేస్ షీల్డ్ ధరించండి. పలుచని ద్రవం లేదా ఇటీవల చికిత్స పొందిన జంతువులను నిర్వహించేటప్పుడు చేయి పాడవు రబ్బరు చేతి తొడుగులు, రబ్బరు బూట్లు మరియు పెద్ద ఆప్రాన్ ధరించండి. చర్మం లేదా కళ్ళ పై ద్రవణం లేదా పలుచని నీరు ఉంటే వెంటనే కడగాలి. స్ప్రే పాగమంచులో పని చేయవద్దు. నోటి ద్వారా అన్ని సంబంధాలను నివారించండి. భారీగా కలుషితమైన దుస్తులను వెంటనే తొలగించండి. ఉపయోగించిన తర్వాత చేతి తొడుగులు బాగా కడగాలి, ముఖ్యంగా లోపల. పని తర్వాత మీ చేతులు మరియు బహిర్గతమైన చర్మాన్ని తినడం, తాగడం మరియు ధూమపానం కు ముందే కడుక్కోండి. మీకు అనారోగ్యంగా అనిపిస్తే, వైద్య సలహా తీసుకోండి (వీలైతే లేబుల్ చూపించండి)

వైద్యుడికి మార్గదర్శి – అమిత్రాజ్ ఒక ఆర్గానోఫాస్ఫరస్ సమ్మేళనం కాదు. విషం ఉన్నట్లు అనుమానించబడితే చికిత్స లక్షణం మరియు సహాయకారిగా ఉండాలి, శ్వాసక్రియ మరియు గుండె పనితీరును పర్యవేక్షించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. అయితే, రికవరీ సాధారణంగా ఆకస్మికంగా ఉంటుంది. అట్రోపిన్ ఉపయోగించవద్దు. వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. వైద్య నిర్వహణ అనేది సున్నితమైన గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ తరువాత సిమ్టోమిక్ మరియు సపార్టివ్ చికిత్స. ఊపిరితిత్తులలోకి ద్రావకం కంటెంట్ ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉన్నందున ఎమెసిస్ నిషేధించబడింది

పర్యావరణ పరిరక్షణ: టాక్టిక్® చేపలకు హానికరం. లైసెన్స్ పొందిన ఉత్పత్తి సూత్రీకరణ లేదా వాడిన కంటైనర్‌తో నీటి వనరులు లేదా చెరువులు, నీటి మార్గాలు మరియు గుంటలను కలుషితం చేయడానికి పదార్థాలను అనుమతించవద్దు

నిల్వ: ఒరిజినల్ జాడీ లో గట్టిగా మూసివేయండి. ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో నిల్వచేయండి.

ఉపసంహరణ కాలం:
మాంసం – పశువులు & మేకలకు 1 రోజు మరియు పందులు & గొర్రెలకు 7 రోజులు.
పాలు – 4 పాలు పితకడం / 2 రోజులు.

కాంతి లేని ప్రదేశంలో నిల్వచేయండి

మంచు నుంచి రక్షించండి – గుర్రాలపై ఉపయోగించవద్దు

ప్రదర్శన – 6 మి.లీ, 15 మి.లీ అల్యూమినియం సీసా, 50 మి.లీ మరియు 250 మి.లీ చిన్న జాడీలు.

®రెజిస్టర్డ్ ట్రేడ్మార్క్,
మందులు ఎలా ఉపయోగించాలో మీ పశువైద్యుడిని సంప్రదించండి.

PD2910091 8 100 x 150 mm

Marketed by :
Intervet India Pvt. Ltd.
6th Floor, Tower 5, World Trade Center, Survey No 1,
Kharadi, Pune – 411014, Maharashtra, India
Ph. No. +91 20 66294700/01;
Email Id – infoin-india@merck.com; www.msd-animal-health.co.in

MSD
Animal Health

IN-TKT-210800002

কেবলমাত্র একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে বা একটি হাসপাতালে বা একটি গবেষণাগারে বা একটি ফার্ম বা খামারে ব্যবহারের জন্য।

অ্যামিট্রাজ ডিপ কনসেনট্রেট লিক্যুইড আই পি

ট্যাকটিক®

12.5% ই সি

কেবলমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য

মানুষের ব্যবহারযোগ্য নয় - কেবলমাত্র পশু চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা উচিত

জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়

উপকরণ:

প্রতি মিলি-তে রয়েছে:

অ্যামিট্রাজ আই পি	125 মিগ্রা
সলভেন্ট এবং ইমালসিফায়ারস্	পরিমাণ মত

প্রস্তুতি:

ট্যাকটিক® হল একটি অত্যন্ত কার্যকরী এক্টোপ্যারাসিটিসাইড, যা অ্যামিট্রাজ-এর অনন্য সক্রিয় উপাদান দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। টিক্স, মাঙ্গে মাইটস্, উকুন এবং কেড-এর উপর এটির অনন্য অ্যাসারিসাইডাল এবং ইনসেক্টিসাইডাল কার্যকারিতার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত কৃষি ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এটি এক্টোপ্যারাসাইটের জীবনচক্রের যে কোনও পর্যায়ে কার্যকরীরূপে তাদের নির্মূল করতে পারে এবং অর্গ্যানোক্লোরিন, অর্গ্যানোফসফেট, কার্বামেট এবং সিন্থেটিক পাইরিথ্রয়েড উপাদান থাকার জন্য এই প্রজাতি বিরোধী। প্রাণী কোষে যেহেতু এটির অবশেষ থাকে না এবং এর অত্যন্ত কম ম্যামালিয়ান বিষক্রিয়ার জন্য, এটি প্রাণীদের সাথে সাথে মানুষদের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত নিরাপদ।

নির্দেশাবলী:

বাছুর, উট, ভেড়া, ছাগল এবং শূকরের টিক্স, গুবরে পোকা, উকুন এবং কেড-এর মত এক্টোপ্যারাসাইটিক সংক্রমণ রোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ট্যাকটিক® অর্গ্যানোক্লোরিন, অর্গ্যানোফসফেট এবং সিন্থেটিক পাইরিথ্রয়েডস্-এর মাধ্যমে চাপ প্রতিরোধ সহ টিক্স, মাঙ্গে মাইটস্ এবং উকুনকে মেরে ফেলে।

প্রয়োগ এবং মাত্রা:

ট্যাকটিক®-কে স্প্রে বা ডিপ চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়।

	স্প্রে		ডিপিং	
পশু	ট্যাকটিক® 12.5%	লিটার জল	প্রাথমিক পূরণ বা ডিপ ভলিউম	রিচার্জ (যখন প্রাথমিক ডিপ ভলিউম 20% হ্রাস পায়)
গরু বা বাছুর	10 মিলি	5	500 লিটার জলে 1 লিটার ট্যাকটিক®	500 লিটার জলে 1.5 লিটার ট্যাকটিক®
উট	10 মিলি	5	-	-
ভেড়া/ছাগল	20 মিলি	5	250 লিটার জলে 1 লিটার ট্যাকটিক®	250 লিটার জলে 1.5 লিটার ট্যাকটিক®
শূকর	20 মিলি	5	-	-

ব্যবহারবিধি

গরু বা বাছুর, উট

স্প্রেয়িং

হ্যান্ড স্প্রেয়িং - 10 লিটার জলে 20 মিলি ব্যবহার করুন। চিকিৎসা করার দিনই, পরিষ্কার জলের সাহায্যে মিশ্রণটিকে প্রস্তুত করবেন। যতক্ষণ না প্রাণীটি সম্পূর্ণরূপে ভিজে যাচ্ছে ততক্ষণ স্প্রে করতে থাকুন।

স্প্রে রেস - প্রাথমিক পূরণ: 500 লিটার জলে 1 লিটার ট্যাকটিক®মেশান। যদি কম পড়ে যায় তাহলে পুনরায় ব্যবহার করার জন্য, প্রতি 100টি গরু পিছু চিকিৎসার জন্য তাতে 150-200 মিলি ট্যাকটিক® আরও গুলে নিন, কিন্তু তাতে আর জল মেশাবেন না। স্প্রে শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রয়োগ করতে থাকুন। যদি আরও স্প্রে করার প্রয়োজন হয়, তাহলে একইভাবে প্রাথমিক হিসাব মত মিশ্রটিকে প্রস্তুত করুন এবং প্রয়োগ করুন।

স্প্রে ওয়াশ রিটেনশন - অব্যবহৃত স্প্রে ওয়াশকে 200 লিটার জলে 2 কিগ্রা পরিমাণে চুন (নূন্যতম 80% ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড সমৃদ্ধ) -এর সাহায্যে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। যদি রেসটি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা না হয়, তাহলে স্প্রেটিকে বিনষ্ট করে ফেলুন। নোট: মাঙ্গে বা উকুন-এর সংক্রমণ গুরুতর হলে প্রথমবার প্রয়োগ করার 7-10 দিন পরে দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়।

ডিপিং

প্রাথমিক পূরণ: 500 লিটার জলে 1 লিটার ট্যাকটিক® মেশান। রিচার্জ: যখন ডিপ ভলিউম 20% হ্রাস পাবে, তখন 500 লিটার জলে 1 লিটার ট্যাকটিক® মেশান। এরপর পরিষ্কার জল দিয়ে পূর্ণ করুন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ মত ট্যাকটিক® মেশান এবং ভালোভাবে নাড়িয়ে নিন। ডিপ-এর অবশিষ্ট মিশ্রণ পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন।

ডিপ ওয়াশ রিটেনশন
যদি ডিপ ওয়াশ মিশ্রণটি পরবর্তীকালে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত করতে চান, তাহলে কয়েকটি সক্রিয় উপাদানের সাহায্যে নিম্নলিখিত উপায়ে এটিকে স্টেবিলাইজ করতে পারেন:
*উপরে লিখিত পদ্ধতির সাহায্যে ট্যাকটিক® দিয়ে ডিপটিকে পরিষ্কার করুন, এবং প্রতি 1.5 লিটার ডিপ সলিউশনে 10 গ্রাম ন্যূন্যতম 80% ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক গ্রেড-এর হাইড্রেটেড চুন মেশান।
*প্রয়োজনীয় রিচার্জের জন্য ট্যাকটিক® সহ, প্রতি 1.5 লিটার ডিপ সলিউশনে 10 গ্রাম চুন যোগ করুন।

ভেড়া এবং ছাগল - ট্যাকটিক® সহ চিকিৎসা করলে, তা টিকস্, মাঙ্গে মাইটস্, উকুন এবং কেডস্ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

স্প্রেয়িং - 10 লিটার জলে 40 মিলি ট্যাকটিক® মেশান। চিকিৎসা করার দিনই, পরিষ্কার জলের সাহায্যে মিশ্রণটিকে প্রস্তুত করবেন। যতক্ষণ না প্রাণীটি সম্পূর্ণরূপে ভিজে যাচ্ছে ততক্ষণ স্প্রে করতে থাকুন।

ডিপিং - ভেড়াদের জন্য ডিপিংই হল প্রস্তাবিত পদ্ধতি। প্রাথমিক পূরণ: 250 লিটার জলে 1 লিটার ট্যাকটিক® মেশান। রিচার্জ: যখন প্রাথমিক ডিপ মিশ্রণটির পরিমাণ 20% কমে যাবে, তখন 250 লিটার জলে 1.5 লিটার ট্যাকটিক® মিশিয়ে রিচার্জ করুন। প্রয়োগ করার দিনই ডিপটিকে প্রস্তুত করুন। পরিষ্কার জল দিয়ে ভর্তি করুন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ট্যাকটিক® যোগ করুন এবং ভালোভাবে মেশান। প্রায় 30 সেকেন্ড ধরে প্রাণীটিকে ডিপ করুন, অন্ততপক্ষে পশুটির মাথাটিকে একবার ডোবান। ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত পশুকে ডিপ করবেন না। ব্যবহার করার পরে ডিপ মিশ্রণটিকে ফেলে দিন। যদি তাদের বাহ্যিক সংক্রমণ হয়ে থাকে বা না হয়ে থাকে তাহলে একটি ফ্লকের সাহায্যে তাদের চিকিৎসা করুন

শূকর - ট্যাকটিক® সহ চিকিৎসা করলে, তা মাঙ্গে এবং উকুনকে একইসাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। 10 লিটার জলে 40 মিলি ট্যাকটিক® মেশান। চিকিৎসা করার দিনই, পরিষ্কার জলের সাহায্যে মিশ্রণটিকে প্রস্তুত করবেন। যদি তাদের সংক্রমণ দেখা যায় বা না যায়, তাহলে সবকটি পশুকে একসাথে একই সময়ে চিকিৎসা করুন। খাবার পাত্র থেকে খাবারগুলি সরিয়ে দিন এবং জল খাবার পাত্রটিকে ঢেকে দিন। পেন্স্ থেকে বেডিংগুলি সরিয়ে দিন এবং পরিষ্কার করুন। পশুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সিক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্প্রে করুন কানে, ভাঁজগুলিতে এবং পিছনের পায়ের ফাঁকে বিশেষভাবে নজর দিন।

প্রতিলক্ষণ এবং সতর্কতা: শিশুদের নাগালের থেকে দূরে রাখুন।
এটি ঘোড়া, বিড়াল এবং চিহুয়াহুয়া প্রজাতির কুকুরের উপর প্রয়োগ করবেন না।

সুরক্ষা - ট্যাকটিক® গরু, উট, ভেড়া, ছাগল এবং শূকরের উপর যে কোনো বয়সে এবং গর্ভাবস্থাতেও প্রয়োগ করা যায়।

সতর্কতা: কেবলমাত্র একজন ভেটেরেনারি সার্জনের তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করুন। গিলে ফেললে এটি ক্ষতিকর হতে পারে। এটি চোখে এবং ত্বকের চুলকানির কারণ হতে পারে। মিশ্রণটি নিয়ে কাজ করার সময় সুরক্ষামূলক পোশাক, রাবার গ্লাভস্ এবং ফেস শীল্ড ব্যবহার করুন। মিশ্রণটি ব্যবহার করার সময় বা সদ্য চিকিৎসাকৃত পশুদের কাছে যাওয়ার সময় আর্ম-লেংথ রাবার গ্লাভস, রাবার বুট এবং বড় অ্যাপ্রন পরিধান করুন। যদি ত্বক বা চোখের কোনো অংশ মিশ্রণের সংস্পর্শে আসে তাহলে অবিলম্বে ধুয়ে ফেলুন। স্প্রে বাষ্পে কাজ করার থেকে বিরত থাকুন। কোনোরূপ ভাবেই মুখের সংস্পর্শে আসতে দেবেন না। অবিলম্বে অত্যন্ত দূষিত পোশাকগুলিকে খুলে ফেলুন। ব্যবহার করার পরে, গ্লাভসগুলিকে বিশেষ করে ভিতরের দিকগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। প্রয়োগ করার পরে আহার করার, পান করার এবং ধূমপান করার পূর্বে হাত এবং শরীরের অনাবৃত অংশগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। যদি আপনি অসুস্থ বোধ করেন, তাহলে চিকিৎসা করান (যদি সম্ভব হয় তাহলে লেবেলটি দেখান)।

চিকিৎসকদের জন্য গাইড - অ্যামিট্রাজ একটি অর্গ্যানোফসফরাস উপাদান নয়। যদি বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখেন, তাহলে লক্ষণ ও উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে, বিশেষ করে রেস্পিরেটরি এবং কার্ডিয়াক ফাংশনের দিকে নজর রাখতে হবে। যদিও স্বাভাবিকভাবেই আরোগ্যলাভ হয়। অ্যাট্রোপিন ব্যবহার করবেন না। বমি করাবেন না। চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা হল মৃদু গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ যার পরে লক্ষণগুলির উপরে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। ফ্লুসফুসে দ্রাবক সামগ্রী প্রবেশের ঝুঁকির কারণে এমেসিস বিরুদ্ধ।

পরিবেশের সুরক্ষা:
ট্যাকটিক® মাছেদের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইসেন্সপ্রাপ্ত পণ্যের মিশ্রণ বা ব্যবহৃত কৌটো জলাশয় বা পুকুরে, জলপ্রবাহে এবং খালে বিনষ্টকরণ করবেন না।

সংরক্ষণ: পণ্যটির নিজস্ব কৌটোতে আঁটোসাঁটোভাবে বন্ধ করে এবং খাদ্যসামগ্রী থেকে দূরে একটি সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষিত করে রাখুন।

আলোর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখুন।

প্রত্যাহারের সময়: মাংস - গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে 1 দিন এবং শূকর ও ভেড়ার ক্ষেত্রে 7 দিন
দুধ - 4 বার দুধ দোয়ানো / 2 দিন

জমে যাওয়া প্রতিহত করুন - ঘোড়ার উপর ব্যবহার করবেন না

পেশ করা হয়েছে - 6 মিলি, 15 মিলি অ্যালুমিনিয়াম বোতল, 50 মিলি এবং 250 মিলি টিন কন্টেনার

®রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
প্রস্তাবিত পণ্যের বিষয়ে আপনার পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

PD29100918 100 x 150 mm

Marketed by :
Intervet India Pvt. Ltd.
6th Floor, Tower 5, World Trade Center, Survey No 1,
Kharadi, Pune – 411014, Maharashtra, India
Ph. No. +91 20 66294700/01;
Email Id – infoin-india@merck.com; www.msd-animal-health.co.in

MSD
Animal Health

IN-TKT-210800002